

Une forme albinos de *Ornithophora radicans* (Orchidaceae, Maxillarieae)^a

Renato Ximenes Bolsanello^{1*} & Liris Fujimori²

Mots-clés/Keywords/Palavras-chave : albinisme/albinism/albinismo, Brésil/Brazil/Brasil, Mata Atlântica/forêt atlantique/Atlantic forest, forêts humides/rainforest/florestas úmidas.

Résumé

Une forme albinos de *Ornithophora radicans*, originaire de la Serra do Castelo, ES (Brésil), est proposée et illustrée.

Abstract

An albino form of *Ornithophora radicans* (Orchidaceae, Maxillarieae) – Albinism is reported for *Ornithophora*. Such a form is presently proposed and illustrated for *Ornithophora radicans*.

Resumo

Uma forma albina de *Ornithophora radicans* (Orchidaceae, Maxillarieae) – Albinismo é reportado para *Ornithophora*. A forma é descrita e ilustrada para *Ornithophora radicans*.

Introduction

Les formes albinos sont de plus en plus documentées chez les *Ornithophora*, et chez les *Maxillarieae* d'une manière plus générale. La forme proposée ici vient des forêts de la Serra do Castelo, ES (Brésil) et correspond en tous points à *Ornithophora radicans*. Cette espèce est commune dans les forêts humides de la Mata Atlântica, principalement dans les états de ES-RS (Chiron & Ximenes Bolsanello, 2014). La plante albinos a été trouvée parmi

^a : manuscrit reçu le 16 février 2016, accepté le 24 février 2016

article mis en ligne sur www.richardiana.com le 26/02/2016 – pp. 171-173 - © Tropicalia

ISSN 1626-3596 (imp.) - 2262-9017 (élect.)

une population de plusieurs plantes typiques. La forme est déjà connue dans le milieu orchidophile comme on peut en juger d'après les photographies publiées sur Internet. Toutefois elle n'a, à ce jour, pas été formellement publiée.

La combinaison correspondante est donc ici validée.



Fig. 1 : *Ornithophora radicans* f. *alba*
plante cultivée (ph. Renato X.Bolsanello)

***Ornithophora radicans* (Reichenbach f.) Garay & Pabst**

Orquidea (Rio de Janeiro) 13 : 50 (1951)

Sigmatostalix radicans Reichenbach f., in Walpers, *Annales botanices systematicae* 6(6) : 859 (1864)

Gomesa radicans (Reichenbach f.) M.W.Chase & N.H.Williams, *Annals of Botany* (Oxford) 104(3) : 398 (2009)

Ornithophora quadricolor Barbosa Rodrigues, *Genera et Species Orchidearum Novarum* 2 : 226 (1882)

***Ornithophora radicans* f. *alba* Ximenes Bolsanello, forma nova**

Haec herba Ornithophora radicans (Reichenbach f.) Garay & Pabst forma typica similis est sed floribus luteis pallidis differt.

Type : Brésil, Espírito Santo, Cariacica, localidade de Pau Amarelo, coleta em fevereiro de 1997, R.X. Bolsanello 03021997 (MBML 49886).

Etymologie : *alba* fait référence au caractère albinos de ce taxon.

Les parties végétatives et florales de cette forme sont identiques à celles de la forme typique de *Ornithophora radicans*. Seule la couleur des fleurs la distingue (Fig. 1) : les fleurs ne possèdent en effet aucune des traces rouges que la forme typique présente, sur la base des sépales et des pétales, sur les lobes latéraux du labelle et sur la colonne.

Références

Chiron, G.R. & R.X.Bolsanello, 2015. Orchidées du Brésil - *As orquídeas da Serra do Castelo (Espírito Santo, Brasil)*, volume 4, Vitória ,ES, 528p.

1 : Rua Dom Jorge de Menezes 1084, Centro, Vila Velha, ES – CEP 29100-250 (Brésil)

* auteur pour la correspondance - renatoxb@hotmail.com

2 : Rua Francisco Dias Velho 831, Vila Cordeiro, São Paulo, ES – CEP: 04581-001 (Brésil)